















**Skubios pagalbos skyriaus**  
Higienos ir dezinfekcijos planas

| DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS   |  | PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*   | PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS   | DEZINFEKCIJOS BŪDAS   | VYKDYTOJAS  |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
|    | HIGIENINIS RANKŲ PLOVIMAS  | „SM-13“<br>ar skystas muilas  | Prieš ir po darbo, vizualiai suteršus, pasinaudojus tualetu  | Užpilama ant rankų skysto muilo, po to plaunama vėsiu tekančiu vandeniu. Nusisausinama vienkartiniais rankšluosčiais.<br>Daugiau informacijos DI 3  | Visas personalas  |  |
|    | RANKŲ DEZINFEKCIJA   | Higieninė   | „Vitasept P“   | Prieš ir po kontakto su pacientais, prieš ir po procedūrų, prieš užsimaunant ir nusimovus pirštines   | Švarias sausas rankas įtrinti 3 ml tirpalo, ekspozicija – 30 s.<br>Daugiau informacijos DI 3  | Visas personalas                             |
|  |  | Chirurginė  | „Sterillium Med“<br>(laikikliui ant lovos)   | Chirurginę rankų dezinfekciją būtina atlikti prieš operacijas ir kitas chirurgines invazines procedūras   | Švarias sausas rankas iki alkūnių 2 kartus įtrinti tirpalu. Ekspozicija po 1,5 min.<br>Daugiau informacijos DI 3  | Medicininis, slaugos personalas              |
|    | PACIENTO ODOS PARUOŠIMAS   | Antiseptinės odos servetėlės arba „Vitasept H“ (bespalvis: 15-90 sek.) arba „Vitasept color“ (spalvotas: 60-90 sek.)  | Prieš kiekvieną procedūrą  | Apipurkšti odą arba nuvalyti priemone sudrėkintu steriliu vienkartiniu tvartščiu  | Medicininis, slaugos personalas   |  |
|   | SLAUGOS PRIEMONĖS  | „Beta Guard Neu“<br>0,5 % - 5 min.<br>1 % - 60 min.<br>arba prauštas naudojimui:<br>„Bactacid AF“<br>30-120 sek.<br>servetėlės<br>„Chemisept wipes MD“<br>30 sek.<br><br>Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai<br>„Chlor-Clean“<br>0,1% -15 min.<br>(1 tabl.-1 ltr. vandens) | Po kiekvieno panaudojimo   | Slaugos priemonės pamerkti į dezinfekuojantį tirpalą. Išlaikius ekspoziciją, nuskalauti geriamu vandeniu, išdžiovinti. Laikyti sausai. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu                               | Slaugos personalas  |  |
|  | PAVIRŠIAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI) NEUŽTERŠTI BIOLOGINIAIS SKYSČIAIS IR ATSPARŪS ALKOHOLIUI               | „Beta Guard Neu“<br>0,5 % - 5 min.<br>1 % - 60 min.<br>arba prauštas naudojimui:<br>„Bactacid AF“<br>30-120 sek.<br>servetėlės<br>„Chemisept wipes MD“<br>30 sek.   | Po kiekvieno paciento  | Valyti dezinfekuojančiu tirpalu. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu, palikti išdžiūti. Visi paviršiai turi būti gerai sudrėkinti, nenutrinti sausai   | Medicininis, slaugos personalas   |  |
|  | MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIAI JAUTRŪS ALKOHOLIUI (pvz. ultragarso aparato, kardiografų davikliai ir kt.) | „Sani Cloth AF Universal“<br>1 – 2 min.   | Po kiekvieno panaudojimo   | Valyti dezinfekuojančiu tirpalu medicinos priemonių (prietaisų) paviršius servetėle, palikti išdžiūti   | Medicininis, slaugos personalas   |  |
|  | ESANT CL. DIFFICILE  | Slaugos priemonių ir paviršių valymas ir dezinfekcija   | „Sterisept Wipes“<br>15 min.<br>„Chlor-Clean“<br>0,1% – 15 min<br>(1 tab. – 1 ltr.vandens)                                   | Slaugant, perkėlus ar išrašius pacientą kuriam patvirtinta Cl. Difficile infekcija  | Greitai paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) paviršių dezinfekcijai, paviršius nuvalyti servetėle. Paviršių valymas ir dezinfekcija darbinio tirpalu atliekama šluostymo, plovimo būdais | Medicininis ir slaugos personalas, valytojas |
|  |  | Medicinos priemonių (prietaisų) valymas ir dezinfekcija   | „Sterisept Wipes“<br>15 min.   | Po kiekvieno panaudojimo  |   |  |
|  | RANKINIS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA   | „DDN9“<br>2 % – 60 min.<br>5 % – 15 min.  | Po kiekvieno panaudojimo<br><i>Jei po panaudojimo per 3 valandas nebūs valomos - užpilti dezinfekcijos valomuoju tirpalu</i> | Pristatoma į sterilizacinę arba pamerkiama į tirpalą. Po ekspozicijos, skalaujami geriamu vandeniu ir atiduodami į sterilizacinę, uždaroje tam skirtoje talpoje, tolesniam mechanizuotam medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai.<br>Daugiau informacijos DI 6 | Slaugos personalas  |  |

\*Išsirašant priemones iš vaistinės būtina atsižvelgti į skyriuje turimus dezinfekcines priemones bei laikiklius.

| DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS   |  | PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*  | PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS  | DEZINFEKCIJOS BŪDAS   | VYKDYTOJAS   |
|--|--|--|---|---|--|
|    | BIOLOGINIAI SKYSČIAI   | Skysčius absorbuojanti medžiaga (granulės)   | Nedelsiant išsiliejus biologiniams skysčiams  | Užberti ant išsiliejusių skysčių, palaukus kelias minutes, susemti ir išmesti į infektuotą medicininių atliekų talpą (šukšliadėžę). Paviršių dezinfekuoti. Daugiau informacijos DI 9.   | Slaugos personalas                                       |
|    | EINAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA  | Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) arba<br>„Beta Guard Neu“<br>0,5 % - 5 min.<br>1% - 60 min.<br><br>Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai<br>„Chlor-Clean“<br>0,1% -15 min.<br>(1 tabl.-1 ltr. vandens)                     | Einamasis patalpų ir aplinkos daiktų valymas atliekamas du kartus dienoje. Užsiteršus – nedelsiant  | Atliekamas šluostymo, plovimo būdais.<br>Daugiau informacijos DI 9  | Slaugos personalas, valytojai                            |
|    | PAGRINDINIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA  | „Beta Guard Neu“<br>1% - 60 min.<br><br>Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai<br>„Chlor-Clean“<br>0,1% -15 min.<br>(1 tabl.-1 ltr. vandens)   | Proceduriniame ne rečiau kaip 2 k./mėn.<br><br>Švarių, nešvarių skalbinių, med. atliekų patalpose ne rečiau kaip 1 k./mėn.<br><br>Kitų patalpų 1 k. per ketvirtį. | Atliekamas šluostymo, plovimo būdais.<br>Daugiau informacijos DI 9  | Slaugos personalas, valytojai                            |
|   | BAIGIAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA  | „Beta Guard Neu“<br>0,5 % - 5 min.<br>1% - 60 min.<br><br>Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir<br>Cl. Difficile<br>„Chlor-Clean“<br>0,1% -15 min.<br>(1 tabl.-1 ltr. vandens)<br><br>„Glosair 400 Cartidge“ su STERINIS aparatu | Izoliacinėse palatose, nustačius užkrečiamosios ligos atvejį, pacientui išvykus   | Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Patalpa vėdinama.<br><br>Prireikus nuvalytų paviršių aerozolinė dezinfekcija, naudojant automatinius purškiklius (generatorius). Daugiau informacijos DI 9  | Slaugos personalas, valytojai                            |
|  | MINKŠTAS INVENTORIUS (pvz: pagalvės, antklodės ir kt.)   | Dezinfekcija vandens garais  | Išrašius pacientą, suteršus – nedelsiant  | Pristatyti į dezinfekcijos kamara<br>Daugiau informacijos DI 5  | Ūkio reikalų tvarkytojai                                 |
|  | SKALBINIAI (pvz: darbo drabužiai, pacientų drabužiai ir kt.)   | Skalbimas skalbykloje  | Panaudojus/suteršus nedelsiant  | Rušiuoti jų susidarymo vietoje, rinkti į tam skirtas, pažymėtas talpas ir perduoti į skalbyklą<br>Daugiau informacijos DI 5   |  |
|  | VALYMO IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ INVENTORIUS (pvz: daugkartinio naudojimo šluostės, šluotų apmavai, kibirai ir kt.) | „Beta Guard Neu“<br>1% - 60 min.<br><br>Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir<br>Cl. Difficile<br>„Chlor-Clean“<br>0,1% -15 min.<br>(1 tabl.-1 ltr. vandens)   | Kasdien po panaudojimo  | Dezinfekuoti, mirkant dezinfekciniame tirpale, skalauti vandeniu, džiovinti arba skalbti skalbimo mašinoje arba perduoti skalbimui į skalbyklą. Valymo inventorių laikyti sausi.<br>WC patalpos naudojamas atskiras, paženklintas valymo/dezinfekcijos inventorių | Slaugos personalas, ūkio reikalų tvarkytojai, valytojai. |

**Parengė:**  
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoja  
Toma Beresnevičienė

Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė  
Kotryna Ilminienė

**Tvirtina:**  
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė  
Rita Butylkina 2024-09-17

