



















VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės  
**Krikščioniškųjų gimdymo namų (baseino)**  
 Higienos ir dezinfekcijos planas

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
	HIGIENINIS RANKŲ PLOVIMAS	„SM-13“ ar skystas muilas	Prieš ir po darbo, vizualiai suteršus, pasinaudojus tualetu	Užpilama ant rankų skysto muilo, po to plaunama vėsiu tekančiu vandeniu. Nusisusinama vienkartiniais rankšluosčiais. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	RANKŲ DEZINFEKCIJA	„Vitasept P“	Prieš ir po kontakto su pacientais, prieš ir po procedūrų, prieš užsimaunant ir nusimovus pirštines	Švarias sausas rankas įtrinti 3 ml tirpalo, ekspozicija – 30 s. Daugiau informacijos DI 3	Visas personalas
	PACIENTO ODOS PARUOŠIMAS	Antiseptinės odos servetėlės arba „Vitasept H“ (bеспалvis: 15-90 sek.) arba „Vitasept color“ (spalvotas: 60-90 sek.)	Prieš kiekvieną procedūrą	Apipurkšti odą arba nuvalyti priemone sudrėkintu steriliu vienkartiniu tvarstėčiu	Medicininis, slaugos personalas
	SLAUGOS PRIEMONĖS	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek.  Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Po kiekvieno panaudojimo	Slaugos priemonės pamerkti į dezinfekuojantį tirpalą. Išlaikius ekspoziciją, nuskalauti geriamu vandeniu, išdžiovinti. Laikyti sausas. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu	Slaugos personalas
	PAVIRŠIAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS (PRIETAISAI) NEUŽTERŠTI BIOLOGINIAIS SKYSČIAIS IR ATSPARŪS ALKOHOLIUI	„Beta Guard Neu“ 0,5 % - 5 min. 1 % - 60 min. arba prauštas naudojimui: „Bactacid AF“ 30-120 sek. servetėlės „Chemisept wipes MD“ 30 sek.	Po kiekvieno paciento	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu. Greitai paviršių dezinfekcijai paviršius nuvalyti servetėle arba nupurkšti su dezinfekcijai skirtu tirpalu, palikti išdžiūti. Visi paviršiai turi būti gerai sudrėkinti, nenutrinti sausiai	Medicininis, slaugos personalas
	MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PAVIRŠIAI JAUTRŪS ALKOHOLIUI	„Sani Cloth AF Universal“ 1 – 2 min.	Po kiekvieno panaudojimo	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu medicinos priemonių (prietaisų) paviršius servetėle, palikti išdžiūti	Medicininis, slaugos personalas
	RANKINIS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„DDN9“ 2 % – 60 min 5 % – 15 min	Po kiekvieno panaudojimo  <i>Jei po panaudojimo per 3 valandas nebuvamos - užpilti dezinfekcijos valomuoju tirpalu</i>	Pamerkiama į tirpalą. Po ekspozicijos, skalaujami geriamu vandeniu ir atiduodami į sterilizacinę, uždaroje tam skirtoje talpoje, tolesniam mechanizuotam medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai. Daugiau informacijos DI 6	Slaugos personalas
	BASEINO VANDENS DEZINFEKCIJA	Skystas chloras (Natrio hipochloritas)	Visą parą naudojant automatinius dozavimo įrenginius	Vandenyje automatinio dozavimo įrenginių pagalba palaikoma liekamojo aktyvaus chloro koncentracija 0,5-3,0 mg/l	Prižiūrintis darbuotojas
	PH VERTĖS BASEINO VANDENYJE MAŽINIMAS	pH minus	Visą parą naudojant automatinius dozavimo įrenginius	Vandenyje automatinio dozavimo įrenginių pagalba palaikomas pH 7,2–7,8	Prižiūrintis darbuotojas

\*Išsirašant priemones iš vaistinės būtina atsižvelgti į skyriuje turimus dezinfekcines priemones bei laikiklius.

DEZINFEKCIJOS OBJEKTAS	PRIEMONĖ KONCENTRACIJA*	PROCEDŪROS PERIODIŠKUMAS	DEZINFEKCIJOS BŪDAS	VYKDYTOJAS
 FILTRAI	-	pagal gamintojo rekomendacijas	Plauti atgaline srove	Pržiurintis darbuotojas
 BASEINO VANDENS PERSIPILDYMO SISTEMA IR GROTELĖS	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per savaitę ir 1 k. per metus (išleidus visos sistemos vandenį)	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Pržiurintis darbuotojas, pagalbinajai darbuotojai
 BASEINO DUGNAS IR SIENOS	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per metus (išleidus visos sistemos vandenį)	Valoma ir dezinfekuojama naudojant aukšto slėgio įrangą	Įmonės pagal sutartį darbuotojas
	-	2 k. per savaitę (dugnas) kas 2 savaites (sienos)	Valoma siurbimo prietaisais ir šepetiais	Pagalbiniai darbuotojai
 DUŠŲ RAGELIŲ GALVUTĖS (baseino patalpose)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.	1 k. per mėnesį	Valyti dezinfekuojančiu tirpalu, išlaikius ekspoziciją, nuplauti vandeniu	Pagalbiniai darbuotojai
 BIOLOGINIAI SKYSČIAI	Skysčius absorbuojanti medžiaga (granulės)	Nedelsiant išsiliejus biologiniams skysčiams	Užberti ant išsiliejusių skysčių, palaukus kelias minutes, susemti ir išmesti į infekuotų medicininių atliekų talpą (šiuksliadėžę). Paviršių dezinfekuoti. Daugiau informacijos DI 9.	Slaugos personalas
 EINAMASIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	Pramoninės gamybos valikliai (plovikliai) arba „Beta Guard Neu“ 0,5% - 5 min. 1% - 60 min.  Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Einamasis patalpų ir aplinkos daiktų valymas atliekamas du kartus dienoje. Užsiteršus – nedelsiant	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai
 PAGRINDINIS PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.  Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Švarių, nešvarių skalbinių, med. atliekų patalpose ne rečiau kaip 1 k./mėn.  Kitų patalpų 1 k. per ketvirtį.	Atliekamas šluostymo, plovimo būdais. Daugiau informacijos DI 9	Slaugos personalas, valytojai
 SKALBINIAI (pvz: darbo drabužiai, pacientų drabužiai ir kt.)	Skalbimas skalbykloje	Panaudojus/pacientų – kas 7 d./suteršus nedelsiant	Rušiuoti jų susidarymo vietoje, rinkti į tam skirtas, pažymėtas talpas ir perduoti į skalbyklą Daugiau informacijos DI 5	Ūkio reikalų tvarkytojai
 VALYMO IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ INVENTORIUS (pvz: daugkartinio naudojimo šluostės, šluotų apmavai, kibirai ir kt.)	„Beta Guard Neu“ 1% - 60 min.  Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir Cl. Difficile „Chlor-Clean“ 0,1% -15 min. (1 tabl.-1 ltr. vandens)	Kasdien po panaudojimo	Dezinfekuoti, mirkant dezinfekciniame tirpale, skalauti vandeniu, džiovinti arba skalbti skalbimo mašinoje arba perduoti skalbimui į skalbyklą. Valymo inventorių laikyti sausai. WC patalpos naudojamas atskiras, paženklintas valymo/dezinfekcijos inventorius	Slaugos personalas, valytojai, ūkio reikalų tvarkytojai

Parengė:  
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovo pavaduotoja  
Toma Beresnevičienė

Infekcijų kontrolės vyriausioji specialistė  
Kotryna Ilminienė

Tvirtina:  
Infekcijų kontrolės skyriaus vadovė  
Rita Butylkina 2024-09-17

